Centro Polispecialistico

C.M.O. s . r . l .

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91
Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA)
MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)

ANGIO - TC AORTA ADDOM I NALE

La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una corretta preparazione all'esecuzione dell'esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- Portare esami eseguiti in precedenza (ANGIO-TC, RM, ECO-COLOR-DOPPLER) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico come segue:
  1) *Angio-Tc Addome completo (**88016.004**) senza e con m.d.c. con ricostruzioni 3D per l'esecuzione dell'angio-Tc dell'aorta addominale (**88902.001**); Rx Torace AP e LL(**87441.001**)* ***PRESTAZIONI N°3***

N.B.:

•I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL 24/09/2015

ESAMI PRELIMINARI

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Azotemia, Glicemia, Creatinina, Emocromo, QPE, GOT, GPT, GFR(serve peso ed età);
- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in alternativa ricerca catene Kappa e Lambda su siero. - Rx torace; - Ecg.

PREPARAZIONE

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione.

Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l'esame:

- assumere al mattino una compressa di *BENTELAN 1 mg.*
- assumere a mezzogiorno una compressa di PANTORC 40.
- assumere alla sera una compressa di *ZIRTEC 10 mg; (O altro antistaminico chiedendo conferma previo colloquio con il nostro anestesista).*

I pazienti che assumono *IPOGLICEMIZZANTI* orali a base di metformina devono sospenderli per 4 giorni (2 giorni prima e 2 giorni dopo l 'esame) e sostituirli con altro *IPOGLICEMIZZANTE* previo colloquio con il diabetologo.

INFORMATIVA

La durata totale dell'esame è di circa 30 minuti;

Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.862.56.91 - 081.861.24.28

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl