Centro Polispecialistico

C.M.O. s.r.l.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO:
Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91 Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA)
MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)

ANGIO - TC DELL' AORTA TORACICA, ADDOMINALE E ARTERIE ILIACHE.

La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una corretta preparazione all'esecuzione dell'esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico come segue: *1) Angio Tc Torace* ***(87411.001)***, *Addome completo* ***(88016.001)****, femore e articolazione coxo-femorale destra* **(88387.003)** e sinistra **(88387.004)** *senza e con m.d.c. con ricostruzioni 3d* ***(88902.001)****;* ***N°5 PRESTAZIONI***

N.B.:

- **INDICARE LA DIAGNOSI SU IMPEGNATIVE COME DA ALLEGATO (D.M. 9 DICEMBRE 2015 CD "LORENZIN");**
- **I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL 24/09/2015**

ESAMI PRELIMINARI

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Azotemia, Glicemia, Creatinina, Emocromo, QPE, GOT, GPT;
- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in alternativa ricerca catene Kappa e Lambda su siero. - Rx torace; - Ecg.

PREPARAZIONE

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione.
Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.
Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l'esame:

- assumere al mattino una compressa di *BENTELAN 1 mg.*
- assumere a mezzogiorno una compressa di PANTORC 40.
- assumere alla sera una compressa di *ZIRTEC 10 mg;(O altro antistaminico chiedendo conferma previo colloquio con il nostro anestesista).* I pazienti che assumono *IPOGLICEMIZZANTI orali* a base di metformina devono sospenderli per 4 giorni (2 giorni prima e 2 giorni dopo l'esame) e sostituirli con altro *IPOGLICEMIZZANTE* previo colloquio con il diabetologo.

INFORMATIVA

- La durata totale dell'esame è di circa 30 minuti;
- Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.862.56.91 - 081.8612428

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl Mod. INF.8 - Rev. 03