Centro Polispecialistico

C.M.O. s . r . l .

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91
Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA)

MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)

UROGRAFIA (PREPARAZIONE PURSENNID)

La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una corretta preparazione all'esecuzione dell'esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Documento di riconoscimento valido; - Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico come segue:

Rx Torace **(87441.001)**; Rx diretta renale **(87790.001);** Rx urografia **(87730.001),** Rx cistografia **(87770.001)**; Rx stratigrafia logge renali pre e post perfusione di m.d.c **(87720.001)**.

N° 5 PRESTAZIONI.

N.B.: •I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL 24/09/2015

ESAMI PRELIMINARI

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;
- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in alternativa ricerca catene Kappa e Lambda su siero. - Ecg - Rx Torace

PREPARAZIONE

Per i tre giorni che precedono l'esame eseguire la seguente dieta alimentare:

- Evitare frutta, verdure, legumi, latticini e cibi integrali;
- Sono permessi pane bianco, pasta in piccole quantità, brodi di carne bianca e pesce.
- Il giorno prima dell'esame al mattino assumere 10/12 compresse di *PURSENNID* tutte insieme aiutandosi con acqua (bere due litri di acqua).
- La sera prima dell'esame eseguire un clistere da 250 ml (da comprare in farmacia).
- Il giorno dell'esame al risveglio effettuare un secondo clistere di 250 ml; osservare digiuno assoluto; si potrà bere e si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l'esame:

- assumere al mattino una compressa di *BENTELAN 1 mg;*
- assumere a mezzogiorno una compressa di PANTORC 40*;*
- assumere alla sera una compressa di *ZIRTEC 10 mg;(O altro antistaminico chiedendo conferma previo colloquio con il nostro anestesista).*

I pazienti che assumono *IPOGLICEMIZZANTI* orali a base di metformina devono sospenderli per 4 giorni (2 giorni prima e 2 giorni dopo l'esame) e sostituirli con altro *IPOGLICEMIZZANTE previo* colloquio con il diabetologo.

INFORMATIVA

- La durata dell'esame è di circa 40 minuti.
- Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.862.56.91

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl