Centro Polispecialistico
C.M.O. s.r.l.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91
Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA)
MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 13/21 Torre Annunziata (NA)

MODULO DI PREPARAZIONE PER URO-RM

La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una corretta preparazione all'esecuzione dell'esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Far preparare dal Vostro Medico l'impegnativa come segue:

- **RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC EV (COD. 88952.001)**
- **ANGIO-RM DELL'ADDOME SUPERIORE (COD. 88953.001)**
- **RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC EV (COD. 88955.001)**

I codici delle prestazioni regionali sono aggiornati secondo la Delibera n°65 del 18/03/2017

La prestazione **Angio-RM** dell'addome superiore è riferita alle acquisizioni per lo studio delle arterie e delle vene renali, in molti casi fondamentale per ottenere un orientamento diagnostico.

In condizioni specifiche la somministrazione del mezzo di contrasto paramagnetico può essere inutile o addirittura controindicata (insufficienza renale): in questi casi le prestazioni da inserire sono **RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA MDC EV (cod. 88952.001)** e **RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA MDC EV (cod. 88955.001)**

ESAMI PRELIMINARI

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Azotemia, Glicemia, Creatinina, Emocromo, QPE, Transaminasi;

- Rx torace;

- Ecg.

PREPARAZIONE

1) I pazienti diabetici che assumono Metformina (ad esempio Metforal, Glucophage, Metfonorm) devono sospenderne l'assunzione 48 ore prima dell'esame dopo aver consultato il medico curante o lo specialista che provvederà a sostituirlo con un altro prodotto antidiabetico. L'assunzione di Metformina potrà avvenire dopo almeno 48 ore dall'esame.

2) I pazienti con insufficienza renale anche lieve devono evitare l'assunzione, nelle 24 ore precedenti l'esame, di farmaci nefrotossici (FANS, antibiotici aminoglicosidi, beta-bloccanti).

3) Per il resto, non è necessario interrompere alcuna terapia farmacologica in atto nei giorni antecedenti l'esame e nel giorno stesso dell'indagine.

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl

4) È necessario rimanere a digiuno da almeno 5-6 ore.

5) È fondamentale limitare l'assunzione di liquidi nelle 5-6 ore antecedenti l'esame a pochi sorsi di acqua liscia.

6) Nel corso dell'esame viene somministrato un farmaco diuretico (Furosemide alla dose di 0,1 mg/kg). È importante che il Medico di base indichi eventuali controindicazioni alla somministrazione del farmaco (anuria, intensa sintomatologia riferibile a ostruzione ureterale, ipersensibilità a furosemide e/o a sulfonamidi, squilibrio idro-elettrolitico, ipotensione) che sarà comunque sempre effettuata da personale specializzato previo colloquio con un Medico Anestesista.

INFORMATIVA ALLA RMN

- La durata dell'esame varia in base ai distretti anatomici da studiare.
- Per qualsiasi chiarimento chiamare al 081.862.56.91, 081.861.24.28.
- I pazienti al momento della prenotazione dell'esame sono tenuti ad informare il personale del Centro per verificare la eseguibilità dell'esame, nel caso in cui si soffre di claustrofobia, si è portatore di Pacemaker cardiaco o di protesi al cristallino, di Clips metalliche (aorta, cervello, ecc.), di protesi metalliche come viti, chiodi o altro, di Schegge o frammenti metallici nel corpo.

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI

E' vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dal C.M.O.Srl